

Sierlijke witsnuitlibel *Leucorrhinia caudalis*



Foto: T. Faassen

Sierlijke witsnuitlibel *Leucorrhinia caudalis*.

Verspreiding en trend

De Sierlijke witsnuitlibel is altijd een zeldzame verschijning geweest en na een waarneming in 1970 bij het Groot Malpieven in Noord-Brabant gold de soort decennia lang als verdwenen uit Nederland. De verrassing was dan ook groot toen Kim Huskens op 6 juni 2006 een mannetje fotografeerde bij de ENCI-vijver bij Maastricht. Dit mannetje bleek redelijk honkvast en werd in de daarop volgende dagen door flink wat mensen bewonderd. Tijdens een excursie op 13 juni bleek het mannetje niet alleen en werd een paringswiel waargenomen, gevolgd door eiafzet (HUSKENS, 2006a, b). Tijdens de goed bezochte tweede excursie op 24 juni kon de soort niet meer worden waargenomen. Onderzoek naar het voorkomen van de Sierlijke witsnuitlibel in 2007 leverde geen waarnemingen van de soort op (BOUWMAN *et al.*, 2007). De soort heeft echter een tweejarige larvale cyclus waardoor een bezoek in 2008 zeker de moeite waard is om te kijken of de soort zich succesvol in ons land heeft weten voort te planten.

Biotoop

De Sierlijke witsnuitlibel wordt meestal waargenomen bij beschutte, stilstaande wateren met een goed ontwikkelde submerse vegetatie. Het voorkomen van vis lijkt voor de Sierlijke witsnuitlibel niet zo'n probleem. De ENCI-vijver, een visvijver die wordt gebruikt door medewerkers van de ENCI-groeve, vormt mogelijk geschikt biotoop voor de soort. Wel-



Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Distribution 1990-1997 (circle), 1998-2007 (dot).



Vliegtijd 1998-2007.
Flight period 1998-2007.

licht duidt de soort ook nog op andere plaatsen met vergelijkbaar biotoop op.

Vliegperiode

De beste tijd om de soort te gaan zoeken is vanaf eind mei tot eind juni.